

:: DENOMINACIÓN Y SINONIMIAS

La denominación de este cultivar hace referencia a la forma apuntada que presentan sus frutos. También se ha encontrado con las siguientes sinonimias: Andaluza, Blanca, Corriente de Aceite, de Calidad, Fina, Grosal, Jabata, Lopereño, Martejo, Morcona, Nevadillo, Nevadillo Blanco, Nevado, Nevado Blanco, Picúa, Redondilla, Salgar, Sevillano y Temprana.

:: DIFUSIÓN E IMPORTANCIA

Es la variedad más importante de España. Actualmente ocupa en Andalucía más de 850.000 ha, dominando en las provincias de Jaén (97%), Córdoba (40%). Es la base de las nuevas plantaciones en todo el país.

:: CONSIDERACIONES AGRONÓMICAS Y COMERCIALES

Variedad de fácil propagación vegetativa por estaca y por estaquillado semileñoso. Presenta elevada capacidad de brotación tras podas severas. La entrada en producción es precoz y su productividad es elevada y constante. Su época de floración es media y se considera autofértil. La época de maduración de sus frutos es precoz y presenta una baja resistencia al desprendimiento, que facilita la recolección mecanizada de los mismos. Es muy apreciada por su rendimiento graso elevado y facilidad de cultivo. La apreciación de su aceite es media, aunque destaca por un alto índice de estabilidad, que implica una gran resistencia al enranciamiento, y por un porcentaje en ácido oleico muy elevado. Variedad rústica por su adaptación a diversas condiciones de clima y suelo. Sin embargo, es sensible a la sequía y a terrenos calizos. Es una variedad tolerante a tuberculosis y lepra, pero muy susceptible al repilo y verticilosis. También es susceptible a la mosca.

**CARACTERES MORFOLÓGICOS****:: ÁRBOL**

Vigor:	<i>medio</i>
Porte:	<i>abierto</i>
Densidad de copas:	<i>espesa</i>

:: FRUTO

Peso:	<i>medio</i>
Forma:	<i>ovoidal</i>
Grado de simetría:	<i>asimétrico</i>
Diámetro transversal máximo:	<i>centrado</i>
Apice:	<i>redondeado</i>
Base:	<i>truncada</i>
Pezón:	<i>ausente o esbozado</i>
Lenticelas:	<i>abundantes y pequeñas</i>
Color en maduración:	<i>negro</i>

:: HOJA

Forma:	<i>elíptico-lanceolada</i>
Longitud:	<i>media</i>
Anchura:	<i>media</i>
Curvatura longitudinal del limbo:	<i>hiponástica</i>

:: ENDOCARPO

Peso:	<i>elevado</i>
Forma:	<i>elíptica</i>
Grado de simetría (A):	<i>asimétrico</i>
Grado de simetría (b):	<i>simétrico-lig.asimétrico</i>
Diámetro transversal máximo:	<i>centrado</i>
Apice:	<i>apuntado</i>
Base:	<i>redondeada</i>
Superficie:	<i>escabrosa</i>
Número de surcos fibrovasculares:	<i>medio</i>
Distribución de surcos fibrov.:	<i>uniforme</i>
Terminación del ápice:	<i>sin mucrón</i>