

'ARRÓNIZ'

DENOMINACIÓN Y SINONIMIAS

Toponímico de la localidad de Arróniz (Navarra). También se ha encontrado con las denominaciones *Hembra* en La Guardia y *Vidrial* en Tudela.

DIFUSIÓN E IMPORTANCIA

Se cultiva en las provincias de Navarra y Álava donde ocupa una superficie de 300 ha.

CONSIDERACIONES AGRONÓMICAS Y COMERCIALES

La época de floración y maduración son medias. Su entrada en producción precoz y presenta una productividad elevada y constante. Sus frutos ofrecen baja resistencia al desprendimiento lo que facilita su recolección. Es apreciada por su elevado contenido en aceite y por la calidad del mismo. Variedad resistente a la sequía y al frío invernal. Parece resistente al repilo y susceptible a la mosca y a tuberculosis.

CARACTERES MORFOLÓGICOS

ÁRBOL

VIGOR:	<i>medio</i>
PORTE:	<i>abierto</i>
DENSIDAD DE COPA:	<i>media</i>

FRUTO

PESO:	<i>medio</i>
FORMA:	<i>ovoidal</i>
GRADO DE SIMETRÍA:	<i>simétrico</i>
DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	<i>centrado</i>
ÁPICE:	<i>redondeado</i>
BASE:	<i>truncada</i>
PEZÓN:	<i>ausente</i>
LENTICELAS:	<i>abundantes y pequeñas</i>
COLOR EN MADURACIÓN:	<i>negro</i>

ENDOCARPO

PESO:	<i>elevado</i>
FORMA:	<i>elíptica</i>
GRADO DE SIMETRÍA (A):	<i>simétrico</i>
GRADO DE SIMETRÍA (B):	<i>simétrico</i>
DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	<i>hacia el ápice</i>
ÁPICE:	<i>apuntado</i>
BASE:	<i>apuntada</i>
SUPERFICIE:	<i>rugosa</i>
NÚMERO DE SURCOS FIBROVASCULARES:	<i>bajo</i>
DISTRIBUCIÓN DE SURCOS FIBROVASCULARES:	<i>junto a la sutura</i>
TERMINACIÓN DEL ÁPICE:	<i>con mucrón</i>

