

'EMPELTRE'



DENOMINACIÓN Y SINONIMIAS

Esta denominación procede de la palabra catalana "empelt" que significa injerto y hace referencia al modo de propagación utilizado para esta variedad. Es conocida con diversas sinonimias como *Aragonesa* en Tortosa, Ulldecona, Vall D'Alba, Vinaroz, *Común* en Sóller, *de Aceite* en Tarazona, *Fina* en Belchite, *Injerto* en Barbastro, *Macho* en Belvis de la Jara, *Mallorquina* en Artá y Mancor, *Navarro* en Belvis de la Jara, *Negral* en Ejea de los Caballeros, *Payesa* en Ibiza, *Salseña* en Tamarite de Litera, *Terra Alta* en Mora d'Ebre y *Zaragoza* en Calatayud.

DIFUSIÓN E IMPORTANCIA

Es la variedad dominante en las comunidades de Aragón y Baleares. También se ha difundido en algunas comarcas de Castellón, Tarragona y Navarra. En total ocupa más de 70.000 ha en España. Fuera de España se ha difundido en Argentina.

CONSIDERACIONES AGRONÓMICAS Y COMERCIALES

La capacidad de enraizamiento de esta variedad es baja por lo que habitualmente se propaga por injerto. La entrada en producción es tardía. Su época de floración es temprana y es considerada parcialmente autofértil y con polen de escaso poder germinativo. La productividad es constante y elevada. La época de maduración de sus frutos es temprana y éstos presentan una baja resistencia al desprendimiento, que facilita su recolección mecanizada. Es muy apreciada por su elevado contenido graso y excelente calidad de aceite. También se utiliza como aceituna de mesa aderezada en negro. Variedad rústica que se adapta bien a terrenos de mala calidad y se considera tolerante a la sequía. Es, sin embargo, más susceptible a las heladas invernales que 'Royal de Calatayud'. Se considera tolerante a aceitunas jabonosas y verticilosis pero sensible a repilo, tuberculosis y mosca.

CARACTERES MORFOLÓGICOS

ÁRBOL

VIGOR:	<i>medio</i>
PORTE:	<i>erguido</i>
DENSIDAD DE COPA:	<i>espesa</i>

HOJA

FORMA:	<i>elíptico-lanceolada</i>
LONGITUD:	<i>media</i>
ANCHURA:	<i>media</i>
CURVATURA LONGITUDINAL DEL LIMBO:	<i>plana</i>

FRUTO

PESO:	<i>medio</i>
FORMA:	<i>alargada</i>
GRADO DE SIMETRÍA:	<i>ligeramente asimétrico</i>
DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	<i>centrado</i>
ÁPICE:	<i>redondeado</i>
BASE:	<i>truncada</i>
PEZÓN:	<i>ausente</i>
LENTICELAS:	<i>abundantes y pequeñas</i>
COLOR EN MADURACIÓN:	<i>negro</i>

ENDOCARPO

PESO:	<i>medio</i>
FORMA:	<i>alargada</i>
GRADO DE SIMETRÍA (A):	<i>asimétrico</i>
GRADO DE SIMETRÍA (B):	<i>simétrico</i>
DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	<i>hacia el ápice</i>
ÁPICE:	<i>apuntado</i>
BASE:	<i>apuntada</i>
SUPERFICIE:	<i>rugosa</i>
NÚMERO DE SURCOS FIBROVASCULARES:	<i>alto</i>
DISTRIBUCIÓN SURCOS FIBROV.:	<i>uniforme</i>
TERMINACIÓN DEL ÁPICE:	<i>con mucrón</i>

'EMPELTRE'

