

'PICUAL'



DENOMINACIÓN Y SINONIMIAS

La denominación de este cultivar hace referencia a la forma apuntada que presentan sus frutos. También se ha encontrado con las siguientes sinonimias: *Andaluza, Blanca, Corriente, de Aceite, de Calidad, Fina, Grosal, Jabata, Lopereño, Marteño, Morcona, Nevadillo, Nevadillo Blanco, Nevado, Nevado Blanco, Picúa, Redondilla, Salgar, Sevillano y Temprana.*

DIFUSIÓN E IMPORTANCIA

Es la variedad más importante de España. Actualmente ocupa en Andalucía más de 850.000 ha, dominando en las provincias de Jaén (97 %), Córdoba (38 %) y Granada (40 %). Es la base de las nuevas plantaciones en todo el país.

CONSIDERACIONES AGRONÓMICAS Y COMERCIALES

Variedad de fácil propagación vegetativa por estaca y por estaquillado semileñoso. Presenta elevada capacidad de brotación tras podas severas. La entrada en producción es precoz y su productividad es elevada y constante. Su época de floración es media y se considera autofértil. La época de maduración de sus frutos es precoz y presentan una baja resistencia al desprendimiento, que facilita la recolección mecanizada de los mismos. Es muy apreciada por su rendimiento graso elevado y facilidad de cultivo. La apreciación de su aceite es media, aunque destaca por un alto índice de estabilidad, que implica una gran resistencia al enranciamiento, y por un porcentaje en ácido oleico muy elevado. Variedad rústica por su adaptación a diversas condiciones de clima y suelo; en particular se estima tolerante al frío, a la salinidad y al exceso de humedad en el suelo. Sin embargo, es sensible a la sequía y a terrenos calizos. Es una variedad tolerante a tuberculosis y lepra, pero muy susceptible al repilo y verticilosis. También es susceptible a la mosca.

CARACTERES MORFOLÓGICOS

ÁRBOL

VIGOR:	<i>medio</i>
PORTE:	<i>abierto</i>
DENSIDAD DE COPA:	<i>espesa</i>

HOJA

FORMA:	<i>elíptico-lanceolada</i>
LONGITUD:	<i>media</i>
ANCHURA:	<i>media</i>
CURVATURA LONGITUDINAL DEL LIMBO:	<i>biponástica</i>

FRUTO

PESO:	<i>medio</i>
FORMA:	<i>ovooidal</i>
GRADO DE SIMETRÍA:	<i>asimétrico</i>
DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	<i>centrado</i>
ÁPICE:	<i>redondeado</i>
BASE:	<i>truncada</i>
PEZÓN:	<i>ausente o esbozado</i>
LENTICELAS:	<i>abundantes y pequeñas</i>
COLOR EN MADURACIÓN:	<i>negro</i>

ENDOCARPO

PESO:	<i>elevado</i>
FORMA:	<i>elíptica</i>
GRADO DE SIMETRÍA (A):	<i>asimétrico</i>
GRADO DE SIMETRÍA (B):	<i>simétrico-ligeramente asimétrico</i>
DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	<i>centrado</i>
ÁPICE:	<i>apuntado</i>
BASE:	<i>redondeada</i>
SUPERFICIE:	<i>escabrosa</i>
NÚMERO DE SURCOS FIBROVASCULARES:	<i>medio</i>
DISTRIBUCIÓN SURCOS FIBROV.:	<i>uniforme</i>
TERMINACIÓN DEL ÁPICE:	<i>sin mucrón</i>

'PICUAL'

